

Test de Lecture

QUESTIONNAIRE "blanc"

Ce questionnaire "blanc", limité à 5 questions, permet de s'entraîner en vue de la session 2009-2010 du Test de Lecture mensuel Prescrire, qui se déroule suivant le nouveau calendrier présenté en page précédente.

Les 5 questions portent sur le n° 309 de juillet 2009. Les réponses figurent en bas de cette page.

1 Parmi les propositions suivantes concernant les infections par les virus de la grippe, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- a- la vaccination contre la grippe saisonnière est la mesure préventive de premier choix
- b- en cas de survenue de grippe saisonnière dans une collectivité où résident des patients à risque élevé de complications de la grippe, la vaccination immédiate des personnes non encore vaccinées contre la grippe fait partie des mesures destinées à limiter la diffusion de l'épidémie
- c- en prévention des complications de la grippe saisonnière, les antiviraux tels que l'*oséltamivir* et le *zanamivir* ont une efficacité largement démontrée
- d- mi-2009, chez les patients ayant une grippe sévère liée au nouveau virus A/H1N1, aucun élément clinique probant ne suggère que les antiviraux (*oséltamivir*, *zanamivir*) modifient de façon décisive l'évolution naturelle de ces gripes

2 Parmi les propositions suivantes concernant des enfants et/ou des adolescents, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- a- pour contrôler les absences (alias petit mal) typiques, l'*acide valproïque* en monothérapie est le traitement de première ligne
- b- chez des enfants traités par gel oral à base de salicylés, appliqué sur les gencives au moment de l'éruption dentaire, des cas de syndrome de Reye ont été signalés
- c- plus de 90 % des enfants atteints de psoriasis en plaques ont une rémission spontanée
- d- chez les enfants fébriles, l'*ibuprofène* est le médicament antipyrétique de premier choix

3 Parmi les propositions suivantes concernant les personnes exposées à l'amiante, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- a- malgré l'interdiction d'utiliser l'amiante depuis 2005 dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, ses effets délétères persisteront pendant plusieurs décennies
- b- la majorité des patients porteurs d'affections bénignes dues à l'amiante développent des cancers

- c- chez les personnes exposées à l'amiante, les mésothéliomes sont les seuls cancers liés à cette exposition
- d- en 2009, la radiographie pulmonaire reste la méthode généralement préconisée d'imagerie thoracique pour la surveillance des personnes exposées à l'amiante

4 Parmi les propositions suivantes concernant les insuffisances rénales d'origine médicamenteuse, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- a- les insuffisances rénales d'origine médicamenteuse sont souvent réversibles à l'arrêt du médicament
- b- en cas d'administration de médicament à toxicité rénale prévisible, la prévention de l'insuffisance rénale médicamenteuse comporte notamment une hydratation normale
- c- du fait du possible passage systémique de la *tobramycine* ophtalmique, son association à d'autres médicaments néphrotoxiques est à éviter
- d- les insuffisances rénales dues aux diurétiques sont toujours liées à une hypovolémie par augmentation de la natriurèse

5 Parmi les propositions suivantes concernant les femmes, cochez (s'il en existe) celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- a- chez des femmes enceintes porteuses d'une bactériurie asymptomatique et traitées par antibiotique, une méta-analyse a montré une réduction statistiquement significative de l'incidence des naissances d'enfant de faible poids
- b- lors de l'accouchement de femmes avec un statut vis-à-vis du HIV inconnu, les tests unitaires rapides de dépistage sont utiles pour démarrer sans retard la prophylaxie de la transmission du virus de la mère à l'enfant par traitement antirétroviral
- c- les risques thromboemboliques d'une contraception estroprogestative sont diminués avec le *désogestrel* et le *gestodène*
- d- pour les femmes souhaitant une contraception hormonale et présentant une acné sans gravité, l'association *éthinyloestradiol* + *cyprotérone* est une association estroprogestative de premier choix

Réponses

1. a : vrai (p. 530) ; b : vrai (p. 530) ; c : faux (p. 529 et p. 530) ; d : vrai (p. 529).
2. a : vrai (p. 489) ; b : vrai (p. 505) ; c : faux (p. 527) ; d : faux (p. 526).
3. a : vrai (p. 514) ; b : faux (p. 514) ; c : faux (p. 515) ; d : vrai (p. 516).
4. a : vrai (p. 509-encadré) ; b : vrai (p. 509-encadré) ; c : faux (p. 496) ; d : faux (p. 496).
5. a : vrai (p. 526) ; b : vrai (p. 525) ; c : faux (p. 496) ; d : faux (p. 496).