

# Rencontres Prescrire - Bruxelles 2010

## Angine Aiguë à Streptocoque du Groupe A en Algérie : Entre la pratique et les données Prescrire Synthèse présentée par Dr H. Boughazi (Généraliste) et Mr D. DIB (Pharmacien)

### ANALYSE DE LA PRATIQUE :

Traitement large de l'angine aiguë (bactérienne ou virale) basée sur la clinique (mal de Gorge + fièvre).

L'antibiothérapie prescrite : la pénicilline, l'amoxicilline, les céphalosporines, l'association amoxicilline + acide clavulanique et rarement la benzathine benzyl pénicilline (BBP).

Association ATB + AINS ou corticoïdes

En cas d'allergie aux B-lactamines : érythromycine en alternative.

### Données épidémiologiques du RAA en Algérie :

Plan national de lutte contre le RAA (PNL-RAA) Janvier 1990 = 1000 cas de RAA/an durant la décennie 90 ;

- ♦ Diminution de l'incidence du RAA chez les enfants âgés entre 4 et 19 ans = 4,7/100000 enfants(2002);1,8 pour 2005 ;
- ♦ Pas de RAA chez les moins de 4 ans ;
- ♦ Risque de survenue de RAA après une Angine Aiguë à SGA = 0,3%
- ♦ Recommandations médicales du programme RAA depuis 1990= traitement systématique de l'angine aiguë chez l'enfant de 4 à 19 ans.

Le choix des médicaments est proche des données Prescrire

### Fiche thérapeutique d'aide à la pratique à proposer aux abonnés Prescrire - Algérie

1. Identification d'une angine aiguë à streptocoque du groupe A en fonction du score diagnostic clinique
2. Traitement systématique des angines fort probables d'origine streptococcique (confirmé par un score diagnostic clinique 4 à 5)
3. Ne pas traiter avec ATB des angines avec un score de 0 à 1
4. En cas de score intermédiaire (2 à 3), différer le traitement de 48 heures (mise en application les données PRESCRIRE) et suivre l'évolution (enfant moins de 04 ans et adulte plus de 19 ans).  
Traiter les enfants entre 04 et 19 ans.
5. Traitement à privilégier : pénicilline V , amoxicilline
6. Traitement de la fièvre : paracétamol (voire données Prescrire - A PROSCRIRE : AINS, Alpha-amylase, corticoïdes, sulfamides
7. Allergie aux  $\beta$ -lactamines : proposition spiramycine ou azithromycine

### Identification d'une Angine Aiguë à Streptocoque du groupe A en fonction du Score Diagnostic clinique (adapté à l'âge)

Référence : Prescrire

5 CRITERES: Température, Absence de Toux, Ganglion cervical antérieur douloureux à l'examen, Atteinte amygdalienne, ÂGE

